

適正使用のお願い

ウイルスワクチン類

MSD 株式会社

劇薬
処方せん医薬品^{注)}

ガーダシル[®] 水性懸濁筋注シリンジ ガーダシル[®] 水性懸濁筋注 組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)

注) 注意－医師等の処方せんにより使用すること

《接種後の注意点》

- ・ 失神に備えて、接種後の移動の際には医療従事者あるいは保護者等が腕を持つなどして付き添うようにしてください。
- ・ 失神し前方に倒れる例も報告されているため、接種後30分程度は体重を預けられるような場所で、なるべく立ち上がることを避けて待機していただくようご指導をお願いいたします。

本剤接種後に失神した症例の中には、転倒により外傷を負った症例が含まれており、歯の破損、欠損に至った症例もありました。本剤の接種に際しては、上記接種後の注意点をご確認いただき、失神による転倒を回避する対策を実施していただくようお願い申し上げます。本剤接種後の失神により転倒し外傷を負った事例は、立っていたり、移動のため立ち上がったたり、あるいは背もたれや肘掛け等がない待合室の長椅子や診察室の丸椅子等で待機させた場合に起こっております。また、背もたれがあっても前方に倒れこむ形で転倒し、外傷を負った症例も報告されております。

《失神について》

- ・ 本剤接種後に失神した例では、接種直後あるいは5分以内での発現が8割を占めます。
- ・ また、予防接種後の失神について、一般的に以下のようなことが知られております。
 - －機序：痛み、恐怖、興奮などに引き続く血管迷走神経反射が原因といわれています¹⁾。
 - －好発年齢：10歳代での発現が過半数を占めます²⁾。
 - －注意すべき対象：注射への恐怖心が強い人等があげられます¹⁾。
 - －処置：下肢を軽く挙上し安静臥床させる。必要に応じて輸液や酸素投与を行う¹⁾。

1) 日本小児科学会予防接種感染対策委員会声明：予防接種後の失神に対する注意点について（2010年9月）

2) CDC. Syncope after vaccination—United States, January 2005–July 2007. *MMWR Morb Mortal Rep* 2008;57:457–460.

次ページに、接種後の失神に対する注意についての指導箋をご案内しておりますので、ご参照ください。

指導箋『子宮頸がん予防ワクチンを受けた後の失神に対する注意について』 のご使用方法

1. 接種前

被接種者様に対して、接種後 30 分程度は体重を預けられるような場所で、なるべく立ち上がることを避けて待機していただくようご指導ください。

2. 接種時

被接種者様のお名前、接種時刻、30 分間安静の目安時刻をご記入いただき、本指導箋を被接種者様にお渡しください。

3. 接種後

診察室から移動する際には、転倒しないよう医療従事者あるいは保護者等が腕を持つなどして付き添うようにご配慮ください。

子宮頸がん予防ワクチンを受けた後の失神に対する注意について

お名前 _____ 接種時刻 _____ 時 _____ 分

接種後にめまいやふらつき、失神などが起こることがあります。失神による転倒やケガを防ぐため、接種後はすぐに帰宅せず、**30分間（時 分まで）は背もたれがあるイスなど、体重をあずけられるような場所にすわり、なるべく立ち上がることをさけて、安静にしてください。**

接種後に診察室から移動するときには、看護師さんや保護者の方に付き添ってもらってください。

もし気分が悪くなったりめまいを感じたら、すぐにスタッフや保護者に知らせ、転倒しないようにイスにもたれかかったり、しゃがむか横になってください。

30分間すわって! **立ち上がらない!**

注射で失神することがあるのはなぜ

注射時の痛み、恐怖、興奮などによる刺激が脳神経のひとつである迷走神経を介して中枢に伝わり、心拍数が低下したり、血管がひろがって血圧が低下したりすることがあります。その結果として、気分が悪くなったり、めまいやふらつき、失神などが起こり、転倒してしまうことがあります。これは、血管迷走神経反射とよばれており、思春期後の女性に多いという報告があります。また、特に注射への恐怖心が強い人には注意が必要です。

通常は横になって安静にするだけですぐに回復します。

イスにすわっている人にも起こることがありますので、まわりの物にぶつかったり床に転げ落ちたりしないように背もたれやひじかけのあるイスにすわって、安静にするようにしましょう。



指導箋（1冊 50 枚入）をご希望の方は、弊社医薬情報担当者までご連絡ください。

本剤接種後の失神症例をご経験された場合には、速やかに弊社医薬情報担当者までご連絡いただくとともに、詳細な調査へのご協力をお願い申し上げます。



MSD 株式会社

〒102-8667 東京都千代田区九段北 1-13-12
ホームページ <http://www.msd.co.jp>

製品情報お問い合わせ先

MSD カスタマーサポートセンター

医療関係者の方：フリーダイヤル 0120-024-961
<受付時間> 9:00~18:00（土日祝日・当社休日を除く）

2012 年 7 月作成