

ペグイントロン®皮下注用 調製時の注意に関するお願い

ペグインターフェロン α -2b 製剤

ペグイントロン®皮下注用50 μ g/0.5mL用
ペグイントロン®皮下注用100 μ g/0.5mL用
ペグイントロン®皮下注用150 μ g/0.5mL用
注射用ペグインターフェロン アルファ-2b（遺伝子組換え）

医療関係者の皆様

2015 年 8 月
MSD 株式会社

謹啓


時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より弊社及び弊社製品に対し格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社製品のペグイントロン®皮下注用 50 μ g/0.5mL 用、ペグイントロン®皮下注用 100 μ g/0.5mL 用、ペグイントロン®皮下注用 150 μ g/0.5mL 用（以下、本剤）につきまして、公益財団法人日本医療機能評価機構の医療事故情報収集等事業において、調製時に添付の注射用水 0.7mL で溶解し、そのまま全量（0.7mL）を投与した事例や、注射用水 0.5mL で溶解し、過量に投与した事例が複数報告されています。

これらの誤調製に基づく過量投与により特定の副作用は報告されていませんが、患者さんの安全性確保のため、本剤の適正使用にご協力ください。

調製時の注意点

本剤を添付の注射用水（0.7mL 全量）で溶解したときの
溶解液 0.5mL 中の含有量は
各表示量（50 μ g、100 μ g、150 μ g）となります



医療関係者の皆様におかれましては、本剤添付文書の＜用法・用量に関連する使用上の注意＞及び「適用上の注意」をご一読いただき、本剤の調製方法を再度ご確認くださいようお願い申し上げます。

謹白

〔お問い合わせ先〕

MSD 株式会社 MSD カスタマーサポートセンター

電話番号：0120-024-961

受付時間：月～金 9：00～17：30（祝日・当社休日を除く）

