

ペグイントロン®皮下注用 調製時の注意に関するお願い

ペグインターフェロン α -2b 製剤

ペグイントロン®皮下注用50 μ g/0.5mL用
ペグイントロン®皮下注用100 μ g/0.5mL用
ペグイントロン®皮下注用150 μ g/0.5mL用
注射用ペグインターフェロン アルファ-2b（遺伝子組換え）

医療関係者の皆様

2016年4月
MSD 株式会社


謹啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より弊社及び弊社製品に対し格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社製品のペグイントロン®皮下注用 50 μ g/0.5mL 用、ペグイントロン®皮下注用 100 μ g/0.5mL 用、ペグイントロン®皮下注用 150 μ g/0.5mL 用（以下、本剤）につきまして、調製時に添付の注射用水 0.7mL で溶解し、そのまま全量（0.7mL）を投与した事例や、注射用水 0.5mL で溶解し、過量に投与した事例が報告されていたことから、2015年8月に注意喚起を実施いたしました。その後、同様の誤調製・過量投与に関する報告はされておりませんが、患者さんの安全性確保のため、今後も引き続き本剤の適正使用にご協力ください。

調製時の注意点

本剤を添付の注射用水（0.7mL 全量）で溶解したときの
溶解液 0.5mL 中の含有量は
各表示量（50 μ g、100 μ g、150 μ g）となります



医療関係者の皆様におかれましては、本剤添付文書の＜用法・用量に関連する使用上の注意＞及び「適用上の注意」をご一読いただき、本剤の調製方法を再度ご確認くださいようお願い申し上げます。

謹白

〔お問い合わせ先〕

MSD 株式会社 MSD カスタマーサポートセンター

電話番号：0120-024-961

受付時間：9：00～17：30（土日祝日・当社休日を除く）

