

「ジョイクル<sup>®</sup>関節注30mg」を投与される  
患者様とご家族の皆様へ

- 投与後数時間は、アナフィラキシーが起こる可能性があります。
- 投与直後から帰宅後にかけて、ご自身の状態をよく観察いただき、体調変化には十分ご注意ください。また、ご家族など周りの方は、帰宅後の患者さんの状態に注意してください。
- 下記のような症状があらわれた場合には、すぐに医療機関を受診してください。受診の際は、ジョイクル関節注を投与されたことを伝えてください。

◆皮膚症状

皮膚のかゆみ、  
じんま疹、  
紅斑・皮膚の  
発赤 など



◆呼吸器症状

声のかすれ、  
くしゃみ、  
のどのかゆみ、  
唇のはれ、  
息苦しさ、  
呼吸困難 など



◆循環器症状

頻脈、動悸、  
顔色が悪い、  
意識の消失、  
ふらつき、  
めまい など



◆消化器症状

腹痛、  
吐き気、  
下痢 など



- 特に、顔色が悪い、意識の消失などのショック症状や息苦しさなどは、緊急性の高い症状です。救急車を呼ぶなど直ちに対応してください。

【お問い合わせ先】

小野薬品工業株式会社 くすり相談室      フリーダイヤル：0120-886-336  
受付時間：9:00～17:00(土日・祝日・会社休日を除く)